



**ČR - Státní rostlinolékařská správa**, organizační složka státu  
SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN  
ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ  
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena Kolouchová / 545 110 477

E-MAIL: [alena.kolouchova@srs.cz](mailto:alena.kolouchova@srs.cz)

DATUM: 5.4.2013

čj.: SRS 019443/2013

## 5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku

**ANTRE 70 WG**

držitel rozhodnutí o povolení: **Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Germany**

registrační číslo: **4718-0**

účinná látka: **propineb 700 g/kg**

platnost povolení končí dne: **31.3.2014**

### 1) rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
jádroviny	strupovitost	0,65-0,75 kg / 1m výšky koruny/ha (max. 2,25 kg/ha)	AT	1) do BBCH 69 (ukončené kvetení), max. výška olistění 3m 3) max. 2x
réva	plíseň révová	0,8-1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%); 1,6-2 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení), max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%)	28	3) max. 2x
réva	černá skvrnitost	2 kg/ha	AT	1) od BBCH 05 (stadium vlny), do BBCH 13 (3 vyvinuté listy) 3) max. 2x
réva	červená spála	1,5 kg/ha do BBCH 71 (nasazování bobulí), max. 750 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%) 2 kg/ha od BBCH 71 (nasazování bobulí), max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%)	28	3) max. 2x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní (přípravek lze aplikovat nejpozději do růstové fáze jaderovin BBCH 69).

Maximální počet ošetření: jádroviny 2 x za vegetační sezónu,  
réva 2 x za vegetační sezónu.

Dávka aplikační kapaliny: jádroviny 200 – 1000 l / ha

réva 200 – 1000 l / ha

Interval mezi ošetřeními: jádroviny 7 – 14 dní

réva 7 – 14 dní

Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije při menším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními.

## **2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:**

### **Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
rajče	hnědá skvrnitost rajčat, čern rajčatová, septorióza rajčat	2,25 kg/ha	3	1) skleníky, fóliovníky
rajče	hnědá skvrnitost rajčat, čern rajčatová, septorióza rajčat	2,25 kg/ha	7	1) pole
třešeň, višeň	skvrnitost listů třešně, strupovitost peckovin, suchá skvrnitost listů peckovin	2,25 kg/ha	28	

Použití preventivně, na počátku infekce dle prognózy a signalizace, max. 2x za sezónu.

U rajčete v BBCH 14 - 85, max. 600 - 1000 l vody/ha, interval mezi ošetřeními: 7 dní.

U třešně a višně v BBCH 59 - 72, max. 300 - 1000 l vody/ha, interval mezi ošetřeními: 10 - 14 dní

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

## **3) Další společné pokyny pro použití přípravku:**

Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými pozemními aplikátory.

Při aplikaci nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Vzhledem k nízké hodnotě suspendovatelnosti je nezbytné míchání kapaliny během aplikace, věnujte zvýšenou pozornost čištění aplikačního zařízení.